

1889
Lane Medical Library
BEITRAG ZUR KENNTNISS

DER

GELEGENEN (SUBFASCIALEN) LIPOME

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE IN DER MEDICIN UND CHIRURGIE

WELCHE

MIT GENEHMIGUNG DER HOHEN MEDICINISCHEN FAKULTÄT

DER

VEREINIGTEN FRIEDRICHS-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG

ZUGLEICH MIT DEN THESEN

FREITAG, DEN 8. MÄRZ 1889, VORMITTAGS 11 UHR

ÖFFENTLICH VERTHEIDIGEN WIRD

ADOLF PLETTNER,

ASSISTENZ-ARZT AN DER KÖNIGLICH CHIRURGISCHEN KLINIK ZU HALLE A. S.

REFERENT: HERR GEH. MED.-RAT PROF. DR. VON VOLKMANN.

OPPONENTEN:

DR. MED. H. KEIL, ASSISTENZ-ARZT D. KGL. FRAUENKLINIK
DR. MED. R. VOLKMANN, ASSISTENZ-ARZT D. KGL. CHIRURG. KLINIK } ZU HALLE A. S.

LEIPZIG,

DRUCK VON BREITKOPF & HÄRTEL

1889.

Imprimatur

Prof: Dr. Eberth,
z. Dekan.

Seinem lieben Vater.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Nach Virchow's Vorgange werden die Lipome gewöhnlich in typöse und tuberöse etc., oder in weiche und feste etc. Formen eingeteilt, Unterscheidungen, welche lediglich die äussere Gestalt und die grob-physikalische Beschaffenheit dieser Geschwulstart betreffen und somit eine nur untergeordnete Bedeutung für sich in Anspruch nehmen können.

Viel wichtiger ist unfraglich die Thatsache, dass den zahlreichen Fettgeschwülsten des Panniculus adiposus eine Reihe solcher gegenübersteht, welche in den tieferen, im allgemeinen fettärmeren Gewebsschichten und Körperregionen sitzen. Für diese würde sich der Name der »subfascialen oder tiefgelegenen Lipome« empfehlen, sodass wir zwei grosse Klassen¹⁾ von Lipomen, die subkutanen und die subfascialen, tiefgelegenen unterscheiden könnten. Diese Einteilung wäre um so berechtigter, als das klinische Bild beider Formen ein so verschiedenes ist, dass die Diagnose der einen zu den leichtesten Diagnosen überhaupt gehört, während das tiefe Lipom unter Umständen erst bei der Operation als solches erkannt werden kann. Auch hinsichtlich der Störungen, welche die Lipome veranlassen, stellen sich die subkutanen Lipome im allgemeinen nur als lästige Beigaben dar, während die tiefgelegene Form, so gutartig sie auch sonst ist, sobald sie einen gewissen Umfang erreicht, durch ihren Sitz zu schwerer Schädigung der benachbarten Organe und selbst zur Gefährdung des Lebens führen kann.

Eine Berücksichtigung dieses wichtigen Unterschiedes finde ich nur in dem klassischen Werke Cruveilhier's²⁾ *Traité d'anat. pathol.* T. III und in Schreger's Aufsatz: »Ueber Lipome und Exstirpation derselben«, *Chirurg. Versuche* Bd. I, durchgeführt.

1) Eine weitere Gruppe würden die submukösen und subserösen Lipome bilden, mit einer Unterabteilung für die Sehnenscheiden- und Gelenklipome (*Lipoma arborescens*). Wodurch würde doch eine scharfe Scheidung der zweiten und dritten Gruppe, wie sich aus den folgenden zeigen wird, nicht möglich sein.

2) Les adipômes (lipômes) occupent le plus ordinairement le tissu adipeux sous-cutané; mais ils peuvent également se produire dans le tissu cellulaire intermusculaire, et rarement dans l'épaisseur des muscles eux-mêmes etc. — Ces tumeurs adipeuses, qui prennent leur origine dans les grands espaces celluloso-graisseux, qui séparent les

Ersterer, welcher auf die Schwierigkeit der Diagnose der tiefgelegenen Lipome aufmerksam macht, giebt an der Hand einer grösseren Zahl züglicher Fälle eine Uebersicht des Vorkommens derselben (*La question de siège étant ici de la plus haute importance*), indem er gleichzeitig auf die Existenz von Uebergangsformen hinweist, insofern das eine eine, wie gewöhnlich, ursprünglich im Panniculus gelegene Geschwulst ihren Lappen in die Tiefe dringt, ein anderes Mal dagegen Fettgeschwülste, die in der Tiefe entstanden sind, bis zur Oberfläche des Körpers durchdringen und zuletzt, selbst die Fascie durchbrechend, teilweise subcutan zu liegen kommen. Cruveilhier greift jedoch hier schon in die Chirurgie hinüber, indem er, in Folge dieser Verhältnisse, bei der Operation derartiger Lipome vor der Verletzung von Gefässen und besonders auch von Nerven warnt.

Schreger, welcher über die Verbreitungsweise der subfasciellen Lipome und ihre Operation allgemeinere Angaben macht, giebt einzelne Anhaltspunkte zur Differentialdiagnose dieser Geschwulstform von ebenfalls tiefliegenden cystischen und weichen malignen Tumoren. Indes sind in keiner Arbeit die bisher bekannt gewordenen Fälle subfascieller Lipome auch nur einigermaassen vollständig zusammengestellt. Ich habe versucht, diese Lücke, soweit ich es konnte, auszufüllen.

A. Tiefgelegene Lipome der unteren Extremität und der Hüftgelenksgegend.

1. Butlin, Henry. Fatty tumor containing striated muscular fibres. *Transactions of the path. soc.* XXVIII.

Mädchen von 7 Jahren mit einem kleinkindskopfgrossen, wahrscheinlich kongenitalen Tumor der rechten Wade, welcher anfangs langsam in letzter Zeit aber schneller wuchs. Nach Durchschneidung des M. gastrocnemius und soleus tritt das von einer derben Kapsel umgebene Lipom zu Tage. Leichte Operation, obgleich der Tumor in's Spatium interosseum hineingewachsen war und, die Knochen auseinander drängend, das Lig.

muscles acquièrent quelquefois un volume considérable avant de se diriger du côté de l'aponévrose d'enveloppe, de vaincre sa résistance et de faire leurs progrès du côté de la peau. On conçoit à quelles erreurs de diagnostic peuvent donner lieu ces tumeurs pendant tout le temps qu'elles sont contenues dans l'épaisseur des membres etc. —

Die von Volkmann bei Gelegenheit der Naturforscher-Versammlung in Bonn 1886 (cfr. das betreffende Tageblatt) entworfene prägnante Skizze der Lipome, welche ganz besonders theils die tiefgelegenen, theils die diffusen, nicht abgekapselten Formen dieser Geschwülste berücksichtigte, ist leider in dem Berichte nur sehr kurz mitgeteilt.

interosseum nach vorn vorwölbte. Eine kleine Schicht Muskelgewebes musste entfernt werden, sonst fand keine Nebenverletzung statt. Das Vorkommen einzelner Muskelfasern in den fibrösen Septis des Lipoms deutet Butlin durch die Annahme, dass die kongenitale Neubildung sich zwischen den Muskelfasern entwickelt habe und in die Muskeln eingewachsen sei, während sie sich erst später abgekapselt habe. Die Operation wurde unter Esmarch'scher »Blutleere« des Gliedes ausgeführt.

2. W. Fischer. Annalen des Charité-Krankenhauses Bd. XIII, 1865.

Tiefgelegenes Lipom der Wade bei einer 20jährigen Arbeiterin, welches infolge chronischer Reizung entstanden sein soll. Operation durch vorhergegangene entzündliche Prozesse sehr erschwert. Die in der Tiefe bis auf das Ligam. interosseum und nach unten bis an die Achillessehne reichende Geschwulst ist mit dem äusseren Kopf des M. gastrocnemius fest verwachsen, so dass ein Muskelstück mit entfernt werden muss. Trotz Erysipel und Hospitalbrand Heilung.

3. J. M. Prat. Considérations sur les tumeurs graisseuses en général et les lipômes en particulier. Thèse de Strasb. 1858.

Kopfgrosses Lipom, welches sich in der Kniekehle zum Teil über, zum Teil unter dem Musc. gastrocnemius entwickelt hatte. Zur Differentialdiagnose empfiehlt Prat die explorative Punktion mit dem Troicar, was leicht verständlich wird, wenn man erfährt, dass er seiner Patientin wegen vermeintlichen »cancer's« den Oberschenkel amputirt hatte.

4. Chirurgische Klinik zu Halle.

Wilhelm H., 10 Jahre alt, rec. am 31. Mai 1882, hat schon im vierten Lebensjahre an einer leichten Schwellung am linken Unterschenkel gelitten, welche allmählich wuchs, so dass schon vor drei Jahren sich ein Arzt veranlasst fühlte, einen Einstich zu machen, der lediglich nur eine »Punctio sicca« blieb. Bei der Aufnahme des Knaben in die Klinik zeigt sich die vordere, äussere Seite des Unterschenkels von einer langgestreckten, ein leicht bläuliches Ansehen darbietenden Geschwulst eingenommen, die nach einwärts bis an die Crista tibiae reicht. Sie beginnt etwa eine Hand breit unter dem Knie und endet einen Finger breit über dem Malleolus externus. Anscheinend durch einen querlaufenden Bindegewebsstrang in der Kapsel ist der Tumor in eine kleinere untere und eine grössere obere Hälfte geteilt. Kein Druckschmerz, deutliches Fluktuationsgefühl, Lappung nicht zu konstatiren. Der Tumor fühlt sich sehr weich, etwa wie eine schlaff gespannte Cyste an. Sehnenscheiden-Hygom vermutet. Bei der Incision am 2. Juni zeigt sich ein unter der Fascie gelegenes, zwischen den Interstitien der vorderen äusseren Unterschenkelmuskulatur gelegenes Lipom, welches

leicht exstirpiert wird. Geringe Blutung, Naht, drei Drains. Li
verband. 4. Juni Verbandwechsel, Wunde reaktionslos. 18. Jul
völlige Vernarbung eingetreten.

5. Durch gütige Mitteilung seitens des Herrn Geheimrat v. Vo
mann erhielt ich von folgendem von ihm beobachteten L
Kenntnis, welcher im Jahre 1868 zur Operation kam:

K., ein bereits älterer Mann, trug in der rechten Kniekehle
gut zwei mannsfaustgrosse, alle Zeichen eines Lipoms darbietende
schwulst, welche an einem kurzen und dicken Stiel bis zur Mitte
Wade herabhing. Bei der Exstirpation zeigte sich, dass grosse trau
Lappen, wie es schien die Löcher von durchtretenden Venen benutzt
die Fascie perforirt hatten und den grossen Gefässen der Kniekehle d
auflagen. Sie liessen sich, nachdem der grössere subkutan geleg
Tumor aus seiner Umgebung gelöst war, durch vorsichtigen Zug allm
lich herausbefördern und völlig exstirpiren. Die Photographie des
mors liegt mir vor. Sie zeigt sehr schön die fingerförmigen Forts
die durch die Fascie in die Tiefe vorgedrungen waren.

6. Christôt M. Lipome intermusculaire de la cuisse. Gaz.
de Lyon No. 18. Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1867¹⁾.
Lipom des Oberschenkels unter dem Vastus externus.

7. Fontan, Cas de recidive et de généralisation de tumeur f
graisseuse. Gaz. méd. de Lyon No. 4, Jahresbericht von Virch
Hirsch 1867.

Eine Frau von 35 Jahren, welche schon vor zwei Jahren w
eines 6 kg schweren Lipoms des Oberschenkels, das unter der F
lata lag, operirt worden war, musste sich wegen eines Recidivs
abermaligen Operation unterwerfen. Gleichzeitig Enucleation des
blindeten rechten Bulbus behufs partieller Exstirpation eines Lip
der Orbita.

8. Lipome d'une volume considérable recidivé etc. Gaz. des b
1855 No. 120, Virchow-Hirsch's Jahresbericht für 1855.

Operative Entfernung eines Lipoms des Oberschenkels bei
Frau von 46 Jahren. Sieben Jahre später: Recidivoperation eines n
unter der Schenkelaponeurose dem intermuskulären Bindegewebe
genden subfascialen Lipoms.

9. Billroth, Chirurgische Klinik zu Zürich.

Joseph W., 55 Jahre alt. Mannsfaustgrosse, für ein Myxosar
gehaltene Geschwulst, innen und hinten am linken Oberschen

1) In den Fällen, bei denen Virchow-Hirsch's Jahresberichte als Quell
gegeben ist, standen mir die Originalmitteilungen nicht zur Verfügung.

seit vier Jahren bemerkt worden war und schmerzlos und langsam wuchs. Bei der Operation fand sich ein subfasciales Lipom. Heilung. (S. 362.)

10. Billroth ibidem.

Barbara B., 46 Jahre alt. Gleichgrosse Geschwulst an derselben Stelle des Oberschenkels, angeblich erst seit einem Jahre entstanden. Die Diagnose lautete wiederum auf Sarkom, während bei der Operation nur ein Lipom vorgefunden wurde. Tod an Septikämie. (1865.)

11. James Paget, Lectures on surgical pathology, Vol. II.

Paget operirte ein nicht prominirendes, auf dem kleinen Trochanter, neben dem Musc. pectineus, tief gelegenes Lipom des Oberschenkels.

12. Cruveilhier, Traité etc.

Velpeau beobachtete ein über 16 kg schweres Lipom an der Innenseite des Oberschenkels eines 55jährigen Mannes zwischen den M.M. M. pector longus und adductor magnus und brevis, welche letztere zur Seite des M. sartorius verdünnt waren.

13. Chirurgische Klinik zu Halle a. S.

Friedrich D., 4 Jahre alt, rec. 1. Mai 1883, entl. 12. Juni 1883. Angeblich erst seit einem Jahre ist ein allmähliches Dickerwerden der Hinterseite des linken Oberschenkels bemerkt worden. Bei der Aufnahme präsentirt sich ein etwas blasses, sonst aber gut genährtes Kind. Das linke Knie ist leicht flektirt, etwas geschwollen, aber schmerzfrei. Vom Kniebeinknorren bis fast zur Kniekehle reicht ein grosser, die Haut in Gestalt einer langen Wurst vorwölbender, seiner ganzen Ausdehnung nach unter einer Muskelschicht liegender Tumor, welcher in seinen oberen Partien das Gefühl der Pseudofluktuatation darbietet. Bei glatter Oberfläche fühlt sich wie ein prallgespannter, tiefliegender Abscess an. Gegen seine Unterlage ist er frei verschieblich. — Nachdem durch Gewichtsextension die Flexionsstellung des Knies beseitigt ist, wird am 30. Mai über die Höhe des Tumors und ziemlich in der Mitte des Oberschenkels eine Incision geführt, welche zunächst die Haut durchtrennt; beim schichtweisen Vorgehen werden sodann noch die Fascie und eine anscheinend dem M. biceps femoris angehörige Muskelschicht durchtrennt, worauf Fettgewebe in grosser Masse prolabirt. Verlängerung des Schnittes nach unten bis zur Kniekehle und nach oben bis zur Incisura ischiadica. Das nunmehr liegende Lipom lässt sich von seiner Umgebung von unten her ziemlich leicht lostrennen, was theils mit scharfen Instrumenten, theils mit den Fingern oder der geschlossenen Cooper'schen Schere bewerkstelligt wird. Man zeigt sich hierbei, dass der Tumor fast in seiner ganzen Ausdehnung mit der Scheide des Nervus ischiadicus zusammenhängt, sodass dieser

nach der Entfernung der Geschwulst im Grunde der Wunde frei und dass ferner Fettlappen mit dem Periost des Tuber ischii und sich an ihm inserirenden Muskelursprüngen fest verwachsen sind. T dem geringe Blutung, 4 Ligaturen. Naht, 5 Drains, Lister'scher Ver

3. Juni 1883 Verbandwechsel. Wunde reaktionslos. Tiefe M und Drains entfernt. 12. Juni geheilt entlassen.

14. James Paget, Lectures etc.

Abernethy teilt einen von Cline operirten Fall von Lipom welches mit der Kapsel des Hüftgelenks verwachsen war.

15. Dr. Dannien, Casuistische Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Rostock. Arch. f. Klin. Chirurgie, XX.

12jähriges Mädchen mit angeborenem kleinem, rundlichem T der linken Hüfte, der langsam und schmerzlos wuchs. Stat. p Linkes Bein der leidlich gut genährten Patientin 3 cm kürzer als rechte, und zwar verteilt sich diese Verkürzung auf Ober- und Unterschenkel, welche gleichmässig im Wachstum zurückgeblieben sind. Fuss ist gleichfalls kleiner und schmaler als der rechte. Trotz stat Beckensenkung unbehülflicher, hinkender Gang. Statische Sko Hüftgelenk frei. An der linken Hüfte zeigt sich ein kugeliges, ansehend fluktuirender Tumor, der durch seichte Furchen in eine vor grössere und zwei kleinere hintere Abteilungen geteilt ist. Der T reicht vom Ligam. Poupartii und der Crista ilei bis drei oder vier C finger unterhalb des Trochanter major und bis zum Tuber ischii, s von 2 cm nach aussen von der Arter. femor. bis an die Symph. s iliaca. Haut normal und leicht verschieblich, kein Druckschmerz, T bei flektirtem Beine leicht gegen das Becken verschieblich. Dreim Punktion ohne jedwedes Resultat. Bei der hierauf vorgenomm Probeincision wird die oberflächliche Fascie, eine dünne Muskelsch sowie eine derbe Bindegewebsschwarte durchschnitten, und zeigt sich ein tiefgelegenes Lipom, das unter geringer Blutung mittels eines o Hautschnittes aus seiner Kapsel ausgeschält wird. Der hintere, u Lappen dringt bis auf die Incisura ischiadica vor; nach der Exstirp liegt die Darmbeinschaufel, die Hüftgelenkscapsel und fast die g linke Beckenhälfte mit dem Ligament. sacrospinosa im Grunde Wunde frei. Der Tumor ist 2300 gr schwer. Heilung nach 6 Wochen, zum Teil per primam intentionem. Eine hohe Sohle be den Gang.

Die Verkürzung des linken Beines wird von D. durch die Inaktivität erklärt, welche eintrat, nachdem die Oberschenkelmuskulatur o den Druck des Tumors atrophisch geworden war. Ein etwaiger D der Neubildung auf die Femurepiphyse kann nicht in Betracht kommen da Ober- und Unterschenkel verkürzt sind und auch bekannterma

Femur oben wenig wächst. Ebenso ist der Druck auf den Nervus ischiadicus als Ursache ausgeschlossen, da hierfür alle Symptome fehlen.

16. Göttinger Klinik Jahresbericht 1875—1879.

Kindskopfgrosses Lipom der Glutäalgegend, welches die Sehne M. gluteus maximus stellenweise durchbrochen hat und wahrscheinlich vom Fettgewebe in der Umgebung des Nervus ischiadicus ihren Ausgang nahm. Starke Ischiasbeschwerden sprachen für diese Annahme.

17. König, Lehrbuch III., p. 257.

K. giebt über einen weiteren Fall von tiefem Lipom der Glutäalgegend folgende kurze Notiz: »Hancock heilte eine langdauernde, schwere Ischias durch Exstirpation einer Fettgeschwulst, welche um den ischiadicus herumgewachsen war.«

B. Tiefe Lipome des Nackens und Rückens.

18. Gallet, Lipome, Opération, mort subite. Gaz. des Hôp. No. 49. Virchow-Hirsch, Jahresberichte, 1867.

Ein 12jähriges Mädchen, bei welchem schon, als sie vier Jahre alt, die Geschwülste bemerkt wurden, zeigte am Rücken ein ulcerirtes Lipom von 50 cm und am Nacken ein nicht ulcerirtes flacheres Lipom kaum halb so grossem Umfang. Zwischen beiden Geschwülsten bestand sich ein freier Zwischenraum von 5—6 cm. Nach Freilegung des Nackenlipoms zeigte es sich, dass dasselbe unter und zwischen die Rückenmuskulatur eindrang. Spaltung des M. trapezius. Bei weiterer Lösung finden sich bis an die Wirbelsäule gehende Fortsätze; ferner ist das Nackenlipom durch ein drittes, vom Rückenlipom verdecktes, mit diesem letzteren in Verbindung, was eine etwas mühsame Präparation veranlasst. Endlich Ausschälen der ganzen Geschwulst bis auf einen scheinbar nach der Vorderseite der Lumbalwirbel gehenden Fortsatz. Eine venöse, intercurrente Blutung steht bald. Exitus lethalis nach einer halben Stunde. Keine Sektion.

19. Bardeleben. Vidal's Lehrbuch der Chirurgie.

3. erwähnt ein 5jähriges Kind mit 7 Zoll langem, 4 Zoll breitem, stützendem Lipom des Rückens, welches unter dem M. latissimus sich lag.

20. Chirurgische Klinik zu Halle.

Frau S., 36 Jahre, hat seit längerer Zeit eine langsam und schmerzwachsende Anschwellung der Lendengegend unterhalb des rechten Hüftbogens bemerkt, welche ihr in letzter Zeit dadurch lästig wurde, dass das Korset an dieser Stelle nicht mehr passen wollte. — Die rechte

Lendengegend zeigt eine ziemlich gleichmässige, nicht druckempfindliche von normaler und in Falten abhebbarer Haut überkleidete Anschwellung, welche sich seitlich von der Wirbelsäule im Raume zwischen unteren Rippenbogen und Spina post. superior oss. ilei wurstförmig ausbreitet. Die Geschwulst bietet eine glatte an den Rändern indess leicht gelbliche Oberfläche sowie das ausgesprochene Gefühl der Fluktuation dar und liegt gegen ihre Unterlage etwas verschieblich; die völlig freie Beweglichkeit scheint durch einen fingerförmigen, mutmaasslich bis auf die Wirbelsäule reichenden Fortsatz behindert. Die Diagnose wird auf ein tief gelegenes Lipom gestellt, die Möglichkeit eines in seiner Aetiologie allerdings völlig unklaren, tiefliegenden Abscesses jedoch nicht absolut ausgeschlossen. — Von einer Probepunktion wird abgesehen und statt dessen die breite Freilegung des Tumors am 28. Februar 1885 vorgenommen. Nach Spaltung der Haut und des oberen Blattes der Fascia lumbodorsalis quillt massiges, von einer dünnen Bindegewebsmembran umschlossenes Fett aus dem Wundspalt hervor. Leichte Ausschälung des Lipoms, welches sich scheinbar zwischen den beiden Blättern der Fascia lumbodorsalis entwickelt hat. Der gut mannsfaustgrosse Tumor kann aus der Wunde herausgewälzt werden, hängt aber noch an einem daumenstarken Fortsatz, welcher fest mit dem Periost des Proc. spinos. des III. Lendenwirbels verwachsen ist. Völlige Exstirpation samt einem Stückchen Periost. Naht, zwei Drains, Verband. Heilung per primam in 14 Tagen.

21. Chirurgische Klinik zu Halle.

Wilhelmine K., 18 Jahr, rec. 6. November 1884, hat seit vier Jahren einen kleinen, anfangs langsam, in letzter Zeit ziemlich rasch gewachsenen schmerzlosen Knoten am Rücken bemerkt. Neben dem Angulus scapulae dextr. des gut genährten Mädchens bemerkt man einen tief sitzenden, halbfaustgrossen Tumor, welcher auf der Unterlage wie auch gegen die normalen Bedeckungen leicht verschieblich ist. Wegen der unregelmässigen Rändern des scheinbar fluktuierenden Tumors deutlich erkennbare Lappung wird die Diagnose auf ein (tief gelegenes) Lipom gesetzt. Dasselbe ist, wie sich bei der Operation am 6. November zeigt, Latissimus dorsi bedeckt und besitzt eine derbe Kapsel. Patientin am 15. November geheilt entlassen.

Die nun folgenden beiden Beobachtungen bieten die Uebersichtlichkeit dar, dass es sich um tief unter den Rückenmuskeln in der Lendengegend entwickelte Lipome handelt, die mittelst einer Art Isthmus oder Stieles, der ebenfalls aus Lipomgewebe besteht, mit einer zu den kleineren Geschwulsttheilen zusammenhängen, welche zwischen Rücken- und Rückenwand liegt. Leider fehlt die Krankengeschichte des Falles, welcher eine bereits ältere Frau betraf, ganz, während auch

Die zweite Beobachtung bei einem $3\frac{1}{2}$ jährigen Kinde nur sehr dürftige Journal-Notizen vorliegen. Nach Mitteilungen des Herrn Geheim-Rat Volkmann lag der verbindende Isthmus in dem ersten Falle zwischen I. und XII. Rippe hart am Wirbelkörper und waren die Rippen hier stark atrophisch resp. auseinander gedrängt, so dass man, nachdem der Tumor hervorgezogen war, ganz bequem mit dem Finger zwischen den Rippen hindurchgehen und die vom Tumor vorher eingenommene im Abdomen gelegene Höhle abpalpieren konnte. Man fühlte ganz deutlich, dass dieser Teil des Lipoms unmittelbar der Niere aufgelegt hatte. Das zweite Mal lag der verbindende Stiel unmittelbar dem unteren Rande der letzten Rippe an. — Nach der damals von v. Volkmann in der Klinik ausgesprochenen Ansicht hatte es sich in beiden Fällen um ursprünglich in der Leibeshöhle gelegene Fettmassen gehandelt, die sich durch Geschwulstinterstitien nach aussen gedrängt und hier weiter entwickelt hatten.

22. Chirurgische Klinik zu Halle.

Frau in den mittleren Jahren. Doppelfaustgrosses Lipom der linken Lendengegend tief unter den Rückenmuskeln, mittelst eines daumenstarken Stiels mit einer kleinapfelgrossen, lappigen und sehr lockern Fettgeschwulst zusammenhängend, die zwischen Niere und den untersten Rippen gelegen ist. Ausschälung nach einem grossen die Fascie und die Rückenmuskeln durchtrennenden Hautschnitt fast nur mit den Fingern. Durch vorsichtigen Zug wird, nachdem der Stiel auf ebenfalls unblutigem Wege aus seinen Verbindungen mit der Nachbarschaft gelöst ist, die in der Leibeshöhle gelegene Abteilung der Geschwulst vollständig und ohne jede Blutung herausbefördert. Ermöglicht wurde dies dadurch, dass mittelst einer der Person in der Seitenlage untergeschobenen Rolle der Intercostalraum zum Klaffen gebracht und mit scharfen Haken noch weiter auseinandergezogen wurde.

23. Chirurgische Klinik zu Halle.

Mädchen von $3\frac{1}{2}$ Jahren. Wahrscheinlich kongenitaler, fast faustgrosser Tumor der linken Lumbalgegend, welcher langsam und schmerzgewachsen ist. Derselbe bietet deutlich das Gefühl der Fluktuation, die normale Haut über ihm ist in breiten Falten abhebbar, der Tumor selbst gegen seine Unterlage so gut wie nicht verschieblich. Die Oberflächche ist glatt, besondere Buckeln oder Lappen treten nicht hervor, die Geschwulst scheint breitbasig aufzusitzen. Bei der am 9. Dezember 1892 vorgenommenen Operation erwies sich dieselbe als abgekapseltes, unter den Muskeln der Lendengegend sitzendes Lipom, das mit einem Fortsatz in die Leibeshöhle eindrang und dort mit einem kleineren, runden, stark lappigen Lipom zusammenhing, welches ganz deutlich die Nierenkapsel auflag. Der verbindende Fortsatz, welcher die Rücken- und hart unter der letzten Rippe und dicht neben dem I. Lendenwirbel

perforirt hatte, war nur an einer Stelle mit dem Querfortsatz des benachbarten Wirbels fest verwachsen; im übrigen liess sich der retroperitoneale Tumor sehr leicht hervorziehen. Die Fettlappen waren, auch im ersten Falle so weich, dass die Geschwulst durch die enge Öffnung durchschlüpfen konnte.

24. Lücke, Pitha-Billroth Bd. II.

»Auch im Nacken habe ich ein Lipom gesehen, welches am Dorsalfortsatz des vierten Halswirbels haftete.«

25. C. Vogt. Einige seltene kongenitale Lipome. Diss. Berlin 1871.

12jähriger Knabe mit faustgrosser kongenitaler Geschwulst in der rechten Cervicalgegend, welche langsam und schmerzlos wuchs, wackelig verschieblich war und eine weiche Konsistenz zeigte. Diagnose bereits vor der Operation richtig gestellt. Nach Durchschneidung der Nackenmuskulatur muss zur Exstirpation des Lipoms noch ein Stück Periost des dritten Halswirbels entfernt werden. Heilung.

26. James Paget. Lectures etc.

Wormald operirte ein subkutanes Lipom des Nackens, dessen Fettlappen oder Fortsätze bis zwischen, oder unter die Muskelbündel des Trapezius reichten.

27. Göttinger Klinik, Jahresbericht 1875—1879.

Lipom-Recidiv bei einer älteren Person seit sechs Jahren bestehend vier Jahre nach der Exstirpation eines subkutanen Lipoms des Nackens entstanden. Bei der Operation zeigt sich, dass Fortsätze bis tief in die Nacken-Muskulatur eindringen und dass das Lipom mit dem Perioste des Processus spinos. fest verwachsen ist.

C. Tiefe Lipome der vorderen Brustgegend.

28. Czerny, Wiener medizinische Wochenschrift, 27. II. Erwähnungen aus meinen Lehrjahren. Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1877.

Kopfgrosses Lipom der vorderen Brustgegend, welches einen grossen Teil zwischen Pleura und Thoraxwand sass. Der VII. Interkostalraum ist durch einen dicken Fortsatz zu einer über hühnereigrossen Lücke erweitert. Exitus lethalis sechs Tage post operat. an septischer Pleuritis, trotzdem die weit blossgelegte Pleura nicht eröffnet worden sein soll.

29. C. Vogt. cfr. oben.

Wahrscheinlich kongenitaler Tumor bei einem 1jährigen Mädchen, welcher die ganze rechte vordere Thoraxhälfte einnimmt und sehr schmerzhaft ist.

wachsen sein soll. Die normale Haut ist in Falten über dem Tumor hebbar, letzterer gegen seine Unterlage aber sehr wenig verschieblich. Das Herz ist nach aussen und unten dislocirt und neben schwachem kükulärem Athemgeräusch ergiebt die physikalische Untersuchung der linken Thoraxseite eine ziemlich ausgedehnt nach links sich hinüberstreckende Dämpfung. Es wird deshalb ein weiterer mit dem ersteren wahrscheinlich zusammenhängender Tumor im vorderen Mediastinal-Raum diagnostizirt. Wegen des schnellen Wachstums und der starken Schädigung des Allgemeinzustandes wird der äussere Tumor exstirpirt. Der Tumor, ein Lipom, geht mit einem dicken Stiel unter den Musculus pectoralis und durch den dritten Intercostalraum in die Brusthöhle. Stiel amputirt. Erysipel, Bronchopneumonie. Tod. Die Sektion zeigt den vorderen Mediastinal-Raum von Lipomgewebe ausgefüllt.

30. Einen gleichen Fall, der von einem anderen Arzte operirt wurde und der ebenfalls tödtlich ablief, hat auch Herr Geh. Rat v. Volkmann mitgetheilt: — Das kindskopfgrosse Lipom sass bei einer älteren Frau an der linken seitlichen Thoraxwand, ein Stiel, der zu einem kleineren, mit der Pleura und Rippen gelegenen, stark hühnereigrossen aber flachen Tumore anhängte, führte, drang in der linken Axillarlinie zwischen vierter und fünfter Rippe durch. Der subpleurale Teil des Tumors wurde erst bei der Sektion gefunden. Bei der Operation war der Stiel nicht erkannt und die Pleura der Brusthöhle gelegene Geschwulstabtheilung infolge dessen zurückgelassen worden. Der Tod erfolgte an Verjauchung dieses Stieles, welche sich bis in die Pleurahöhle fortsetzte und eine septische Pleuritis und Perikarditis veranlasste.

31. Nach mündlichen Mittheilungen an Geh. Rat v. Volkmann hat Dr. Bernhard v. Langenbeck selbst einmal eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Auch hier handelte es sich um ein anscheinend oberflächliches, recht grosses Lipom des Thorax, welches jedoch ebenfalls mittelst eines daumenstarken Stieles mit einem zwischen Pleura und Thoraxwand gelegenen zweiten Lipom zusammenhing. Infolge einer sehr heftigen die Operation begleitenden Blutung wurden dieser Stiel, so wie auch die innere Abtheilung der Geschwulst übersehen, und der Tod trat auch infolge von jauchiger Pleuritis ein.

32. Cruveilhier, *Traité* etc.

C. theilt einen Fall von einem auf dem Sternum gelegenen Lipom mit, welches ein ungenannter Chirurg operirte. Die seitwärts vom Sternum in die Brusthöhle gehenden Fortsätze wurden zum grössten Theil abgezogen und amputirt. Tod an eitriger Mediastinitis.

33. Cruveilhier, *ibidem*.

Morel-Lavallée entfernte nur den vor dem Sternum gelegenen Theil eines hinter dasselbe gehenden Lipoms.

D. Tiefe Lipome der Achselhöhle, Schultergegend und oberen Extremitäten

34. Cruveilhier, *ibid.*

Lipom der Achselhöhle unter der Aponeurose, von Cloquet beobachtet, bei dessen Operation der Nervus radialis durchschnitten wurde »qui était placé au centre de la tumeur.« Nach Gangrän des Armes trat der Tod des Patienten ein. Cruveilhier fügt hinzu: »ce dernier établit que dans l'exstirpation des lipômes sous-aponévrotiques, il faut tenir compte de la possibilité de la présence des vaisseaux ou des nerfs sur la circonférence de la tumeur.«

35. Cruveilhier, *ibid.*

C. fand bei einer Konsultation ein scheinbar subkutanes Lipom der Axilla, dessen Hälfte indess unter dem Pectoralis major lag.

36. Cruveilhier, *ibid.*

68jährige Frau, bei welcher behufs Differentialdiagnose zwischen einem »Encephaloid« und einer Cyste an der Schulter eine Punktion mit negativem Resultat gemacht wurde. Bei der Operation wurde ein zweilappiges Lipom fester Konsistenz entfernt, dessen grössere Lappen unter dem M. deltoideus, dessen kleinerer unter dem M. pectoralis sich entwickelt hatte.

37. Anger, Benjamin. Observation de lipôme profond du bras adhérent à la face interne de l'humerus. Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1875 II.

Subfasciales Oberarm-Lipom.

38. Meyer. Verkalkte Lipome. Virchow's Arch. f. path. Anat. XXXII.

Ein zum Teil verkalktes Lipom unter dem atrophischen Biceps des Oberarms, an der Leiche eines alten Mannes.

39. Cruveilhier. Traité etc.

Broca beobachtete ein zwischen der hohen und tiefen Muskelschicht der Flexorenseite des Unterarms entwickeltes Lipom.

40. Cruveilhier, *ibid.*

Boulard beobachtete ein Lipom der Ellenbogenbeuge von länglich cylindrischer Gestalt, welches zwischen dem Musc. brachii internus und M. supinator longus sass und nach oben zwischen M. triceps und Humerus eindringend die Aponeurose des Unterarms emporhob.

41. Cruveilhier, *ibid.*

Verneuil beobachtete ein Lipom des Vorderarms von rundlicher Gestalt und der Grösse einer Orange zwischen M. radialis externus und

inator longus, welches zum guten Drittel seiner Oberfläche unter der Dura mater lag und vom Hautast des Nerv. radialis gekreuzt wurde; letzterer war an einer Stelle mit dem Lipom verwachsen.

42. Cruveilhier, *ibid.*

Broca operirte ein unter dem M. extensor digitorum commun. gelegenes zum Theil verkalktes Lipom des Vorderarms.

43. Mærloose. Exstirpation d'un lipôme. Bull. de la soc. médec. de Gand. Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1867.

Lipom tief zwischen der Vorderarm-Muskulatur.

44. Vigenaud, Lipôme de l'avant-bras en bissac, développé des deux côtés du ligament interosseux. Exstirpation en deux temps. Guérison. Gaz. des hôp. No. 8. Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1868.

Die Neubildung hatte hier wahrscheinlich nahe am Ellbogen, am Ende des Ligam. interosseum ihren Ursprung genommen und war dann auf beiden Seiten desselben weitergewachsen.

E. Tiefe Lipome des Halses.

45. König, (Lehrbuch I, 522.)

K. operirte ein Lipom der tieferen Schichten des Halses, welches im Raum zwischen Zungenbein und Kehlkopf ausging.

46. Gosselin, Lipôme mou sus- sous- et rétroclaviculaire, ablation par énucléation avec les doigts. Gaz. des hôp. No. 147. Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1870, II. (1869, I.)

Frau von 32 Jahren mit einem seit vier Jahren bemerkten, orangefarbenen Lipom des Halses, welches unter dem Subcutaneus colli zwischen Hyocleidio und Trapezius und teilweise unter der Clavicula seinen Ursprung hatte.

47. Cruveilhier, *Traité* etc.

Prof. Roux operirte einen Zimmermann wegen eines unter dem Namen »Muscle peaucier« sitzenden Lipoms des Halses von der Grösse eines Truthennen-Eies, welches er zuvor seiner deutlichen Fluktuation wegen für einen kalten Abscess gehalten und mit Applikation »de la pommade caustique« behandelt hatte.

48—52. Petit. Nouveaux faits de lipôme sus-claviculaire. Gaz. hebdomad. de méd. et de chir., No. 1. Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1884, II.

Petit theilt fünf Fälle von Lipom der Fossa supraclavicul. bei Frauen mit, bei deren Operation stets die grossen Nerven und

Gefässstämme des Halses freigelegt wurden, meist auch die Spitze der Pleura. In einem Falle war das Lipom zwischen die Stränge des Plexus brachialis hineingewachsen. In einigen dieser Fälle hatten deutliche Symptome von Druck auf die Nerven des Plexus bestanden.

53. Taylor, Frederik, Fatty tumor behind the pharynx. Transactions of the pathol. soc. XXVIII.

Vierjähriges Mädchen mit einem Lipom des Halses, welches, der Wirbelsäule sitzend, um Oesophagus und Trachea nach beiden Seiten herumgewachsen war, so dass es anfänglich für eine Struma gehalten wurde, später wegen Verdachts auf Abscess verschiedentlich pungirt worden war. Tod an Erstickung, ohne dass eine Operation gewagt worden wäre.

54. James Paget, Lectures etc.

Liston beobachtete ein subkutanes Lipom am Halse, dessen Operation dadurch schwierig wurde, dass Lappen desselben bis an die Trachea und Speiseröhre reichten. Nähere Angaben fehlen leider.

55. C. Vogt. cfr. oben.

$\frac{3}{4}$ Jahre alter Knabe, bei dem schon gleich nach der Geburt am Halse eine naevusartige Geschwulst bemerkt worden war, die allmählich, aber immer schneller wachsend, sich bis zu reichlicher Faustgrösse entwickelte. Der Tumor, welcher die vordere Halsgegend bedeckte, nahm sich wie eine grosse Struma aus und reichte vom linken Unterkiefer bis zur Clavicula und vom linken Acromio-clavicular-Gelenk bis auf die rechte äussere Seite der Trachea, diese letztere samt Larynx und Jugulum verdeckend. Pulsation der linken Halsgefässe nicht fühlbar, Tumor wenig verschieblich, jedoch von Larynx und Trachea abziehbar und gegen das Jugulum zu umgreifbar. Ausserdem fühlt man eine strangförmige Verlängerung in die Tiefe in der Gegend des linken Musc. sterno-cleido-mastoideus, welche die Verschieblichkeit behindert. Im übrigen ist der Tumor weich, an einer Stelle geradezu fluktuierend. In der Tiefe fühlt man jedoch einen etwas härteren Knoten, während die oberflächlichen Lagen beim Anschlagen mit dem Finger sülzartig erzittern, ebenso auch beim Schreien eine zitternde oder undulirende Bewegung der Geschwulst zu konstatiren ist. Keine Drucksymptome. Auf der Aussenfläche des Tumors zwei warzenartige, naevusähnliche Gebilde. Operation: Elliptischer Schnitt durch den normal dicken Panniculus; Durchschneiden der Fascia superficialis. Stumpfes Vorgehen, indess zuweilen sorgfältig präparirend, zumal da, wo die strangförmige Verlängerung am linken Musc. sterno-cleido-mastoideus in die Tiefe geht, und wo sich das Lipom mit der Gefässscheide der Vena jugularis communis verwachsen zeigt. Vorher ist der Ansicht, dass an dieser Stelle der Ausgangspunkt der Neubildung zu suchen war. Heilung.

56. Billroth, Chirurgische Klinik zu Zürich etc.

Herr X., circa 55 Jahre alt, mit einer Geschwulst des Halses in der linken Supraclavikulargegend, welche, seit längerer Zeit bestehend, bei der Exstirpation sich als grosses, teilweise fibröses, unter der tiefen Halsfascie gelegenes Lipom darstellt.

57. Bei der Sektion eines schwer verletzten älteren Mannes fand ich selbst ein doppelseitiges, auf und zwischen den Strängen des Plexus axillialis gelegenes, teilweise fibröses Lipom des Halses.

58. Chirurgische Klinik zu Halle.

Der Knabe O., 3 Jahre alt, zeigt an der rechten Seite des Halses im Trigonum cervicale inferius eine gleichmässig kugelige Vorwölbung über normalen, in breiter Falte abhebbaren Bedeckungen. Die Geschwulst war schon bald nach der Geburt bemerkt worden und ohne Beschwerde langsam gewachsen. Der untere äussere Rand des Sterno-cleido-mastoideus ebenso wenig wie der untere innere Rand des Cucullaris abzutasten. Der Tumor zeigt keine Lappung oder Fortsätze und lässt sich scheinbar durch Druck verkleinern. Letztere Erscheinung beruht indess auf Täuschung. Denn während unter gewöhnlichen Verhältnissen keine Geschwulst in der Achselhöhle zu fühlen ist, tritt jetzt eine nicht bloss durch das Gefühl, sondern auch für das Gesicht deutlich erkennbare, stark kugelige und deutlich lappige Schwellung in der Achsel hervor. Der hier mit Sicherheit als Lipom zu diagnostizierende Tumor wird also durch Druck hinter der Clavicula hindurch (Mohrenheim'sche Grube) unmittelbar unter die Hautdecken der Axilla getrieben.

Bei forcirter Compression scheint der kleine Patient Schmerzen im rechten Arm zu haben. Pulsation oder Gefässgeräusche sind nicht vorhanden; ebenso wenig sind Verwachsungen nachweisbar, vielmehr ist der Tumor nach allen Seiten hin ziemlich gut verschieblich.

Die Operation (Dezember 1853) liess sich auf die Weise ausführen, dass nach Spaltung der Halsfascie der stark lappige, aus relativ »trockener« Fett bestehende und sehr derbe Bindegewebs-Septa und Hüllen umhüllende Tumor, der von selbst schon stark vorquoll, fast nur mit den Fingern herausgelöst werden konnte. Namentlich konnte ein fingerlanger und ebenso dicker Fortsatz, der mit den Nervensträngen unter der Clavicula hinweg in die Achselhöhle trat, wo er zu einem dickeren, lappigen Ende anschwellt, durch vorsichtigen Zug ganz unblutig hervorgebracht werden. Nach der totalen Entfernung des Tumors gelang es leicht einen Katheter von der Halswunde aus hinter der Clavicula in die Achselhöhle zu schieben und mit dessen Schnabel die Haut emporzuheben. Der Tumor hatte hier also unmittelbar unter der Haut gelegen.

Schwierigkeiten entstanden nur dadurch, dass ein zweiter kleiner Lappen unter die erste Rippe reichte, so dass die Pleuraspitze freigelegt werden musste, was übrigens ebenfalls völlig unblutig ohne Gebrauch von schneidenden Instrumenten gelang. Eine weitere Schwierigkeit war dadurch gegeben, dass endlich der Tumor ziemlich breit der Vena jugularis communis aufsass, mit deren Scheide er an einer Stelle fest verwachsen war. Die Blutung war trotzdem ausserordentlich gering und erheischte nur wenig Ligaturen. Zwei Drains. Naht. Die Heilung erfolgte ohne irgend welche Störung in 14 Tagen.

59. Chirurgische Klinik zu Halle.

Obersteiger M., 49 Jahre alt, Oktober 1883 Exstirpation eines tiefliegenden, faustgrossen Lipoms des Halses in der Regio supraclavicularis dextra. Aehnlicher Fall wie der oben beschriebene.

60. Ibidem.

Paul S., 18 Jahre alt, Malerlehrling aus Giebichenstein, aufgenommen am 4. Februar 1887, entlassen am 15. Februar 1887. Patient hat seit einem Jahr eine langsam zunehmende Anschwellung seines Halses in der Gegend des Kehlkopfs bemerkt, welche keine Beschwerden verursacht, ihn aber der steten Vergrösserung wegen klinische Hilfe und Anspruch zu nehmen veranlasst. Bei der Untersuchung erweist er sich als ein kräftiger junger Mensch ohne stärkere Entwicklung des Panniculus mit scheinbarer Struma von Faustgrösse. Der von normaler Haut bedeckte Tumor lässt sich indess gegen die Unterlage leicht verschieben und zumal von der Trachea und dem Larynx abziehen. Er reicht links vom Unterkiefer bis fast zur Clavicula herab; rechts, weniger ausgedehnt, umgreift er die Organe der Mittellinie und füllt den Raum zwischen beiden Sterno-cleido-mastoideis ziemlich aus. Die freie Beweglichkeit ist nur an einer Stelle etwas behindert, nämlich in der Höhe des Kehlkopfs am Rande des linken M. sterno-cleido-mastoideus, wo eine strangförmige Verlängerung in die Tiefe geht. Der Tumor zeigt weiche Konsistenz an einzelnen Stellen selbst Pseudo-Fluktuation, aber an seinen Grenzen undeutliche Lappung. Symptome von Druck auf die linksseits scheinbar schwächer pulsirenden Gefässe fehlen. Die Diagnose wurde auf ein tiefgelegenes Lipom des Halses gestellt und bei der Operation am 1. Februar 1887 bestätigt. Nach einem langen Hautschnitt in der Mittellinie dicht unter dem Kinn beginnend bis hinab nahe zum Jugulum wird das Platysma und die Fascie durchtrennt, und das nunmehr zu Tage tretende Lipom zum grossen Teil stumpf ausgelöst. Es liegt in der Mittellinie des Halses. Je ein lappiger Fortsatz reicht jedoch beiderseits in die Regio submaxillaris, links weiter als rechts. Ein weiterer Fortsatz geht links fast bis an's Schlüsselbein hinab. An der oben bezeichneten Stelle, am inneren Rande des Sterno-cleido-mastoideus

fordert ein mit der Scheide der grossen Gefässe zusammenhängendes, unter dem Muskel liegendes Anhängsel eine etwas mühsamere Präparation. geringe venöse Blutung, die leicht gestillt wird. Zwei Contra-Incisionen, zwei Drains. Naht. Das Lipom ist gut mannsfaustgross. Am 9. Februar 1887 Verbandwechsel, Reaktionsloser Verlauf. Tiefe Nähte und Drains entfernt. Am 15. Februar geheilt entlassen.

F. Lipome der Fossa canina.

61. Bruns, Handbuch der Chirurgie. Tübingen 1859.

Auvert teilt folgenden Fall mit: (Selecta praxis medico-chirurgicae: Paris 1848.) Mädchen von 18 Jahren mit einer Geschwulst der Fossa canina, welche gegen den Knochen nicht verschieblich ist und sich beim Kau zwischen die Zähne drängt. Bei der vom Munde aus vorgenommenen Exstirpation erweist sich der Tumor als gänseeigrosses Lipom mit intralem Konkrement (Speichelstein?!) Heilung nach drei Wochen.

62. Bruns, ibidem.

O. Acrel (chirurgische Geschichte im K. Lazareth zu Stockholm etc.) teilt einen Fall von angeborenem Lipom an gleicher Stelle (fossa canina) mit, welcher nur partiell exstirpirt wurde.

63. Bruns, ibidem.

B. operirte bei einem 19jährigen Mädchen ein kongenitales Lipom der Lippengegend, welches langsam wachsend Mannsfaustgrösse erreicht hatte. Die Lage entsprach ziemlich genau derjenigen der Parotis, es reichte von der Nase her, eine halbkugelige Form darbietend, bis fast zum Kehlkopf herab. Die Oberfläche war von normaler, verschieblicher Haut bedeckt, schmerzlos und beweglich. Die Lippe zeigte bei derber, körniger Konsistenz lappige Fortsätze. Nach der mit einem $\perp$ Schnitt, aber ohne sonderliche Blutung, und ohne dass eine Ligatur notwendig gewesen wäre, ausgeführten Exstirpation liegen der N. facialis und die Teilungstelle der Carotis comm. im Grunde der Wunde. Heilung per secundam intentionem.

G. Tiefe Lipome des Kopfes.

Die tiefgelegenen Lipome am Kopf sind kürzlich sehr ausführlich von Grosch in dessen »Studien über das Lipom« (Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 26) besprochen worden, und zwar giebt er eine Zusammenstellung von 22, theils von ihm selbst, theils von anderen Autoren beobachteten unzweifelhaft subfascialen oder submuskulären Lipomen, von denen vier kongenitale waren, und ferner von 15 Fällen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls als tiefgelegene Lipome angesprochen werden können. Unter diesen letzteren 15 Fällen befindet sich eine weitere angeborene Neubildung.

Ich teile die 22 von Grosch selbst für unzweifelhaft hierher gehörig gehaltenen Beobachtungen nachstehend kurz im Auszuge mit und schliesse denselben Fälle aus der Hallenser Klinik an:

64. Grosch l. c.

52jähriger Bauer mit apfelgrossen Lipom unter der Galea in der Mitte der Stirn. Vor drei Jahren, bald nach einem heftigen Stoss, hat Patient eine erbsengrosse Geschwulst bemerkt, welche gleichmässig wuchs. Dieselbe ist von normaler, verschieblicher Haut überzogen, gegen ihre Unterlage wenig verschieblich, von weich elastischer Konsistenz, nicht fluktuierend, auch nicht druckempfindlich, und zeigt deutliche Lappung. Eine seichte Vertiefung im Os frontis unterhalb der Geschwulst ist von einem niedrigen, zirkulären Wall umgeben. Bei der im übrigen leichten Auslösung des Tumors muss ein Stück Periost mit entfernt werden.

65. Grosch l. c.

37jährige Bauernfrau. Seit einigen Jahren ohne bekannte Ursache entstandene, langsam wachsende, zur Zeit wallnussgrosse Geschwulst über dem linken Tuber oss. frontis, von halbkugeliger Gestalt, ohne Lappung, und von weich elastischer, fast fluktuirender Konsistenz, ohne Druckempfindlichkeit. Durch Druck ist der Tumor nicht zu verkleinern. Derselbe zeigt auch keine pulsatorischen oder respiratorischen Bewegungen; die Haut ist normal, und der Tumor gegen seine Unterlage nicht verschieblich. Bei der Exstirpation zeigt sich ein abgekapseltes, zwischen dem Epicranium und der Uebergangsstelle des Musc. temporalis in die Galea gelegenes Lipom.

66. Grosch l. c.

52jährige Frau, welche vor 3 bis 4 Jahren nach einem heftigen Stoss an der linken Stirne einen erbsengrossen, erst in letzter Zeit ohne Beschwerden zu gut Haselnussgrösse herangewachsenen Knoten bemerkt hat. Derselbe erweist sich als ein zwischen dem Epicranium und der Galea gelegenes Lipom, welches weich elastische Konsistenz, sowie undeutliche Fluktuation darbietet und ebensowohl gegen die Haut als auch gegen seine Unterlage verschieblich ist. Deutliche Lappung; Knochen normal.

67. Grosch l. c.

63jähriger Mann. Seit 30 Jahren ohne bekannte Veranlassung an der Stirn entstandener, jetzt halb wallnussgrosser, weich elastischer von normaler Haut bedeckter und verschieblicher Tumor, welcher sich als subaponeurotisches Lipom erweist. Der Patient litt gleichzeitig an einem Lippencarcinom.

68. Grosch l. c.

Aus Cruveilhier, Traité etc. entnommen: C. hielt einen in der oberen rechten Stirngegend einer Leiche befindlichen, halbkugelig

tumor von der Grösse einer halben Reineclaudé für ein Atherom; derselbe erwies sich jedoch bei der Exstirpation als ein zwischen Periost und »aponévrose epicranienné« gelegenes, abgekapseltes Lipom.

69. Geheimrat v. Volkmann ging 'es kürzlich bei einem sehr bekannten Gelehrten ganz ähnlich. Ein auf der Stirn, hart an der Grenze des Haarwuchses gelegener wallnussgrosser Tumor wurde für ein Atherom gehalten. Bei der Exstirpation erwies sich derselbe jedoch ebenfalls als ein sehr weiches, stark gelapptes, hart dem Periost anliegendes und an einer Stelle mit demselben verwachsenes Lipom.

70. Grosch l. c.

Aus einer Arbeit von Gruber in Virchow's Archiv, Bd. 77 entnommen: An der Leiche eines älteren Mannes fand sich eine den grössten Theil der Stirn flach vorwölbende, derbe, elastische Geschwulst, welche von normaler Haut überzogen, aber gegen ihre Unterlage nur wenig verschieblich war. An der Glabella hatte man den täuschenden Eindruck einer Usur des Knochens. Nach Durchschneidung der gut entwickelten L. M. frontales trat ein abgekapseltes Lipom zu Tage, welches sich ohne Nebenverletzungen stumpf auslösen liess und nur an den Rändern leichte Appositionen und Einkerbungen zeigte.

71. Grosch l. c. (Aus Grüter, Diss. Greifswald 1853.)

Ein 65jähriger Arbeiter hat vor 36 Jahren die Entstehung einer kleinen Geschwulst auf der rechten Kopfseite bemerkt, welche langsam und schmerzlos wuchs, bis sie die Grösse eines Kindskopfes erreichte und von der Mitte des rechten Scheitelbeins bis über den Supraorbitalbogen herabhing. Die pralle, derbe Geschwulst ist gegen die normale, aber von erweiterten Venen durchzogene Haut wie auch gegen ihre Unterlage verschieblich und lässt weder Lappenbildung noch Fluktuation erkennen. Leichte Auslösung eines unter der Galea gelegenen Fibrolipoms nach Durchtrennung einer circumscribten Verwachsung mit dem Periost.

72. Grosch l. c. (Fehleisen — Ueber Lipome der Stirn, Sitzungsbericht der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1852.)

Kleinapfelgrosser, halbkugelig, prall-elastischer, fast fluktuirender Tumor der linken Stirnseite, welcher ebenso gegen seine Unterlage wie gegen die Haut verschieblich ist. Eine starre, zirkuläre Infiltration des Periostes und des subaponeurotischen Zellgewebes könnte einen Knochenwall vortäuschen. Oberfläche lappig.

73—74. Grosch l. c. (Beobachtung von Fehleisen.)

Zwei Männer im Alter von 30 und 40 Jahren wurden wegen tiefgehenden Lipoms der Stirngegend operirt. Beide Tumoren erschienen

von einem ähnlichen, nach der Operation verschwindenden harten Wall umgeben.

75. Grosch l. c. (Beobachtung von Fehleisen.)

Angeborenes Lipom über dem inneren Augenwinkel bei einem jungen Mädchen. Zirkulärer, faktisch existirender Knochenrand um eine ziemlich tiefe Mulde des Stirnbeins, in der das Lipom liegt.

76. Grosch l. c.

Im Anschluss an den Fehleisen'schen Vortrag in der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg 1882 giebt Rüdinger an, ein nicht kongenitales Lipom der Stirn extirpirt zu haben, dessen Auslösung grosse Mühe machte. Die subaponeurotische Lage ist nicht ausdrücklich betont, geht aber aus der Beschreibung mit Sicherheit hervor.

77. Grosch l. c. (Aus Fischer: Mittheilungen aus der chir. Klinik zu Göttingen 1861).

46jähriger Mann mit langsam und schmerzlos in acht Jahren zu Wallnussgrösse herangewachsener Geschwulst der rechten Stirnseite. Die Geschwulst ist weich, nicht fluktuirend, auf der Unterlage fixirt, aber von normaler, verschieblicher Haut bedeckt. Zirkulärer harter Rand. Nach der unter geringer Blutung ausgeführten Exstirpation des Lipoms zeigt sich ein seichter Eindruck auf dem Pericranium.

78. Grosch l. c. (Aus Wheeler, Dublin Journal of med. Sc. 73)

75jähriger Mann mit grossem Lipom der Gegend des linken Stirn- und Seitenwand-Beins, welches angeblich nach einem Trauma und zwar schmerzlos entstanden sein soll, sich derb anfühlt, an einer Stelle undeutlich fluktuirt und von der Arteria temporalis pulsatorische Erscheinungen erhält. Circumscribte feste Verwachsung mit dem Periost.

79. Grosch l. c.

Volkmann's Fall (Beiträge zur Chirurgie S. 275) betraf gleichfalls ein subfasciales, unmittelbar dem Knochen aufliegendes Lipom. Nach mündlicher Mittheilung hat er noch eine grössere Anzahl derartiger Geschwülste, theils von der Stirn, theils von den vorderen Partien des brennenden Schädels entfernt, die sämtlich subfascial gelegen waren. Einmal in dem straffen Gewebe der dünnen subkutanen Fettschicht an dieser Stelle entstandenen Lipomes erinnert sich Volkmann nicht. Erst in der Schläfengegend, wo die Haut wieder beweglicher wird, sah er die gewöhnlichen Formen des Lipomes vorkommen.

80. Grosch l. c. (Aus Mac Cormac, Lancet, 1880.)

Lipom bei einem 11jährigen Mädchen auf dem Scheitelbeinhöcker, welches dem Pericranium adhärirt.

81. Grosch l. c. (Aus Sydney Jones, Deutsche Zeitschr. für Chirurg. Bd. XII.)

Im zweiten Lebensmonat bemerkte, in letzter Zeit rascher gewachsene Geschwulst bei einem 20 monatlichen Knaben, von der Grösse und Form einer halben Orange, welche, über der Sutura sagittalis gelegen, die eine Fontanelle erreicht und das Gefühl von Fluktuation darbietet. Keine Symptome von Zusammenhang mit dem Schädelinnern. Leichte Ablösung des unter der Galea gelegenen, an den Rändern gelappten Lipomes.

82. Grosch l. c. (Aus Fieber, Deutsche Zeitschr. für Chirurg., Bd. XII.)

55jähriger Mann mit einem innerhalb acht Jahren bis zum Umfang einer kleinen Orange herangewachsenen Lipom auf dem linken Scheitel, welches von derber elastischer Konsistenz ist, aber keine lappige Gestalt, sondern eine glatte Oberfläche zeigt und auf seiner Unterlage etwas verschieblich ist. Den tiefen Sitz, welcher von F. nicht ausdrücklich angegeben ist, schliesst Grosch wohl mit Recht daraus, dass die normale Haut in breiten Falten abhebbar war. Etwas schwierige Ablösung des Lipoms von seiner Unterlage. Heilung.

83. Grosch l. c. (Aus Bruns, Handbuch der Chirurgie; cfr. auch Grüter, Diss., Greifswald 1883).

21½jähriger Knabe mit erbengrosser Geschwulst am Hinterhaupt geboren, welche zur Zeit der Operation trotz teilweiser Zerstörung durch Stützmittel bereits kindskopfgross geworden ist. Der Tumor fühlt sich an wie ein mit Wolle ausgestopfter Sack, also völlig charakteristisch an und zeigt Fluktuation und Pulsation an zwei Stellen. Unter geringer Blutung wird trotz alledem die Geschwulst, welche bis auf eine der Sutura lambdoidea entsprechende Stelle gegen ihre Unterlage gut verschieblich ist, ohne grosse Schwierigkeit, fast nur stumpf aus ihrer Umgebung abgelöst. Es ist ein fünf Pfund schweres Lipoma fibrosum.

84. Grosch l. c. (Aus Chassaignac, Bull. de la soc. anat. Paris 1836.)

Lipom zwischen dem Pericranium und dem Musc. epicranius (frontalis oder occipitalis?).

85. Grosch l. c. (Aus Nancrede, Congenital fatty tumour beneath occipito-frontal muscle.)

Der Sitz ist aus dem Titel einigermaßen ersichtlich.

86. Grosch l. c. (Aus Heineke, Deutsche Chirurgie, 1882, Lief. 31. Die chirurg. Krankheiten des Kopfes.)

H. hat ein subepicranielles Lipom von Faustgrösse am Hinterhaupt eines 15jährigen Manne beobachtet, welches derselbe seit frühester

Jugend trug. Dasselbe hat eine auffallende Aehnlichkeit mit einer Kphalocele.

87. Grosch l. c. (Aus König, Lehrbuch, Bd. I.)

Lipom unter der Fascie des Musculus temporalis. ¹⁾

Aus der Hallenser Klinik kann ich nur noch einen Fall anführen, da ich nur eine einzige bezügliche Krankengeschichte aufgefunden habe, obwohl faktisch eine grössere Reihe solcher Fälle von Geheimrat v. Volkmann operirt worden sind, wie er auch mehrere grössere Lipome der Fossa canina zu operiren Gelegenheit hatte, über die jedoch ebenfalls keine genaueren Notizen vorliegen.

88.

Wilhelm S. 43 Jahre alt, am 6. Januar 1885 Exstirpation eines fowelschnussgrossen, tiefgelegenen Lipoms der Stirn.

H. Tiefe Lipome an Hand und Finger.

Auch bezüglich der tiefen Lipome an Hand und Fingern verweise ich auf die Arbeit von Grosch, so wie auf eine Mittheilung Ranke's aus der Volkmann'schen Klinik im Arch. für klin. Chirurgie Bd. XX: »Ueber Lipome an der Volarseite der Finger.« Dass diese Lipome nicht zu den subkutanen zu rechnen sind, geht schon daraus hervor, dass bei denselben die Haut in Falten abhebbar ist. Die Zahl der von Ranke und Grosch mitgetheilten Fälle beträgt sechs Handtellerlipome (89—94) und sechs Fingerlipome (95—100). (Zwei weitere Handlipome sind zweifelhaft.)

Die tiefen Lipome der Vola manus sind hiernach folgende:

89. Grosch l. c. Aus der Dorpater Klinik.

50jährige Frau mit einer vor ungefähr fünf Jahren ohne bekannte Ursache entstandenen Geschwulst des Handtellers, welche ausser leichter Flexions-Kontraktur und dadurch bedingter mässiger funktioneller Störungen keine weiteren Symptome darbot. Die Haut ist normal und verschieblich. Die scheinbar von den Sehnenscheiden ausgehende, aus drei wurmförmigen Abtheilungen bestehende Geschwulst zeigt das deutliche Gefüge der Fluktuation und ebenso das für Reiskörper-haltige Hygrome so ausserordentlich charakteristische Knarren und Reiben. Trotzdem war, wie die Operation zeigte, das vermeintliche Sehnenscheiden-Hygrom ein unter der Palmarfascie gelegenes, den Sehnenscheiden adhärentes Lipom, welches an zwei Stellen bis in den Intermetacarpal-Raum vordrang, sodass bei stärkerem Druck diese Partien sich auf dem Dorsum manus als kleine

1 Ich habe zur Beschreibung dieser Fälle theils die Originalarbeiten, theils Grosch'sche Referat benutzt.

erwölbungen fühlen liessen. Das Gebiet des Carpus und Vorderarmes
r völlig frei geblieben.

90. Grosch l. c. (Aus Boinet, Gazette des hopitaux, 1866. Lipôme sous-aponévrotique de la paume de la main.)

Auch hier war bei einer 53jährigen Frau die Diagnose auf ein Sehnen-
scheiden-Hygom gestellt, weil neben der eigentümlichen fächerför-
rigen den Sehnnenscheiden folgenden Anordnung deutlich Fluktuation und
Krepitation vorhanden zu sein schien. Bei der Operation liessen sich
verschiedenen Abteilungen und Lappen der Geschwulst nach Frei-
legung des Haupttumors durch Zug leicht herausbefördern. Der Tumor
r circa acht Jahre vorher zuerst bemerkt worden.

91. Grosch l. c. (Aus Trélat, Gazette des hopitaux 1868. Lipôme de la main, simulant une kyste synoviale.)

Frau von 58 Jahren mit zwei rundlichen, allmählich und ohne we-
entliche Beschwerden entstandenen Geschwülsten auf dem Thenar und
1. Metakarpal der Vola manus, welche den Vorderarm völlig frei liessen
und Fluktuation und Krepitation darboten, so dass ein Carpalhygom
diagnostiziert wurde. Aus einer 3 cm langen der Axe der Hand parallel
gelegten Incision wurde ein zweilappiges den Flexorensehnen auflie-
gendes Lipom mittels leichten Zuges exstirpiert.

92. Grosch l. c.

In der an letzteren Fall in der Société impériale de chirurgie sich
anschliessenden Diskussion berichtet Tillaux über einen weichen fluk-
tuirenden, jedoch nicht krepitirenden Tumor der Vola manus, der für
eine Cyste gehalten worden war, sich jedoch gleichfalls als ein einer
Flexorensehne aufsitzendes Lipom darstellte.

93. Grosch l. c. (Aus Albert, Lehrbuch der Chirurgie, 1884. Bd. II.)

Leicht in die Daumenmuskulatur eingebettetes Lipom, welches
nach der Incision förmlich von selbst herausprang.

94. Grosch l. c. (Aus Notta, Lipôme de la paume de la main.

Bull. et mém. de la soc. de chir. de Paris, 1882. (Nach Virchow-
Hirsch's Jahresberichten referirt.)

65jähriger Patient mit einem seit sechs Jahren bemerkten Lipom
an der Vola manus, das sich bis unter die Flexoren der Finger erstreckte,
dessen Exstirpation mühsam war.

Die Lipome an den Fingern, welche ich aus den Arbeiten von
M. Notta (Archiv für klinische Chirurgie XX: über Lipome an der Volar-
fläche der Finger) und von Grosch l. c., p. 340 zusammenstelle, sind
folgende:

95. Aus Hygiea Svenska, Läkareselskabs Förhandl. Virchow's Jahresberichte für 1869.

67jähriges Weib mit einem seit 30 Jahren bemerkten Lipom an der Mittelfalanx des linken Ringfingers, das fast keine Beschwerden machte, von Neyber aber für ein Enchondrom gehalten worden war, weshalb derselbe den Finger exartikulierte.

96. Aus Billroth, Gesamtbericht über die chirurg. Kliniken Zürich und Wien.

12jähriger Knabe, dem vor sieben Jahren ein fast hühnereigrosses Lipom an der Volarfläche der I. Phalanx des rechten Zeigefingers existierte war, wurde 1874 wegen eines Recidivs operiert, welches innerhalb fünf Jahren die vorige Grösse wieder erreicht hatte.

97. Aus Billroth, eod. loco.

18jähriger Mann mit einem Lipom am linken Zeigefinger, welches von kavernenösen Venen-Ektasien durchzogen war und die Grösse eines mittleren länglichen Kartoffel hatte. Exstirpation.

98. Aus der Chirurgischen Klinik zu Halle (Ranke.) 1869.

15jähriges Mädchen, Schneiderin, welche als Ursache der Geschwulstentwicklung den Druck der Schere am Mittelfinger angiebt. Seit drei Jahren bemerkte sie eine erbsengrosse, ziemlich harte, unempfindliche, die Funktion nicht behindernde Geschwulst an der II. Phalanx des Mittelfingers, welche sich allmählich nach der I. Phalanx zu vergrösserte. Nach Anstrengungen traten leichte, bald rückgängig werdende Entzündungen ein. Stat. praes. Wurstförmiger von glänzender, gespannter, aber doch in feiner Falte abhebbarer Haut überzogener Tumor, welcher die II. und einen Teil der I. Phalanx des Mittelfingers einnimmt und sich weich und teigig, ja fast fluktuierend anfühlt. Keine Lappung nachweisbar. Die Diagnose wurde zwischen Hygrom und Lipom offen gelassen. Bei der hauptsächlich auf stumpfe Weise bewerkstelligten Exstirpation wurde die Sehnscheiden nicht eröffnet, aber freigelegt. Naht. Permanente Immersion. Heilung ohne Störung der Motilität. Das Lipom zeigte keine Andeutung von Lappenbildung.

99. Chirurgische Klinik zu Halle. Ranke l. c.

Frau R., 55 Jahre alt, hat vor sechs Jahren an der Spitze der Endphalanx der Volarfläche des rechten Daumens eine erbsengrosse, unempfindliche, weiche Geschwulst bemerkt, welche langsam wachsend die erste Phalanx erreicht hat. Stat. praes. Wurstförmiger, unempfindlich weicher, wie es scheint, deutlich fluktuierender Tumor, der keine Lappenbildung zeigt. Haut mässig gespannt, aber in Falten abhebbar; leichte Gebrauchsbehinderung des Daumens. Die Diagnose wurde unter A

liessung eines Ganglions oder Hygroms (Anamnese!) auf Lipom gestellt, bei dessen Exstirpation sich ähnliche Verhältnisse wie im vorhergehenden Falle vorfanden!

100. R. v. Volkmann, Virchow-Hirsch, Jahresbericht 1866. Bd. II.

v. V. giebt an ein, ganz wie ein Hygrom aussehendes, nicht bloss kutirendes, sondern deutlich durchscheinendes Lipom einer Flexorennarbe eines Fingers exstirpirt zu haben.

I. Tiefe Lipome am Fusse.

101. Löbker, Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Greifswald.

Subfasciales, wahrscheinlich kongenitales Lipom bei einem 3jährigen Knaben, welches ein Hygrom vortäuschte, an der Planta pedis.

102. Closset. Zur Kasuistik der Lipome, Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie II.

Kongenitales, nach längerem Stillstand seit einem Jahr schnell gewachsenes Lipom des Fussrückens von Kleinkindskopf-Grösse bei einem 4jährigen Knaben. Kein Riesenwuchs an den Zehen. Ausschälung bis zu einem der Dorsalfläche des Oss. naviculare und des II. und III. Keilbeins adhären den Stiel. Secunda intentio. Der Tumor war 350 grm schwer.!

Schliesslich sei noch erwähnt, dass Cruveilhier (Traité etc.) und Volkmann (Pitha-Billroth II, 599) je ein Lipom in der Muskelsubstanz selbst gesehen haben.¹⁾

Wie die Aetiologie der meisten Geschwülste, so ist auch diejenige der Lipome trotz mancher aufgestellter Theorien zur Zeit noch so gut wie völlig unaufgeklärt. Virchow nimmt eine örtliche Ursache, ein Traumatema, welches die Zellen zu stärkerer Entwicklung bringt, an, kann aber dabei der Annahme einer allgemeinen Disposition nicht entbehren, welche seiner Meinung nach in den meisten Fällen erworben ist, aber auch hereditär (kongenital) vorkommen soll. Cruveilhier lässt die multiplen Lipome aus einer Diathese hervorgehen; über die soliden äussert er sich folgendermaassen: »Les bourses sous-cutanées sont produites par des pressions avec frottement, les tumeurs graisseuses par des pressions sans frottement.« Rindfleisch meint, es seien im

¹⁾ Annandale, Notes on tumours Brit. med. Journ. 1868 und Hodges, R. M. Exceptional fatty tumours. Boston med. and surg. Journ. 1884 standen mir leider nicht zur Verfügung; aus den bezüglichen Referaten in Virchow-Hirsch ist leider nicht zu ersehen, ob es sich mit Sicherheit um tiefe Lipome gehandelt hat.

Körper selbst entstehende, lokal wirkende innere Reize vorhanden. Bi-
roth findet die Bedingung der Lipomentwicklung in spezifischen Eigen-
schaften des Gesamtorganismus, welche auf den lokalen Reiz reagierten. V-
ist mit diesen Theorien, wie man sieht, wohl kaum gewonnen. Schreg-
dagegen gesteht in seiner oben zitierten Arbeit offen ein: »Veranlassung
zur Entstehung der Lipome sind keine bekannt. Sie (d. h. die bezüg-
lichen Geschwülste) sind meistens früher vorhanden, als die Kran-
kheit, selbst deren Existenz kennen. Mechanische Ursachen werden selten an-
gegeben und ihr Zusammenhang mit der Entstehung des Lipoms ist nicht
nachzuweisen.«

Leider ist auch die neueste Arbeit über diesen Gegenstand von
Grosch (Deutsche Zeitschr. für Chirurgie Bd. 26), in der er die Ätio-
logie der Lipome aus ihren Beziehungen zu dem Drüsenapparat der Haut
erklären will, wohl als ein interessanter, aber leider doch missglückter
Versuch anzusehen. — Seine Schlussfolgerungen gehen von der Beobach-
tung aus, dass Lipom und Obesitas die gemeinsame Eigentümlichkeit
besitzen, sich vornehmlich an hautdrüsenarmen Stellen des Körpers
entwickeln. Das Lipom tritt aber entweder bei Personen auf, welche
wie das weibliche Geschlecht überhaupt zur Ueberproduktion von Fett
neigen, oder es entwickelt sich in einem Lebensalter, welchem der Er-
blichpunkt eigentümlich ist. Auf Grund dieser angeblichen Thatsachen be-
zieht sich Grosch zu dem Ausspruch berechtigt: »dass die Obesitas und die
Lipombildung pathologische Erscheinungen darstellen, die sich zwar na-
ch der formalen Seite von einander merklich unterscheiden, jedoch ihr
Wesen nach vollständig identisch sind«. (??) Hierbei sind zunächst die
tiefen Lipome gar nicht berücksichtigt. Ferner sind die allgemeine
Hypertrophie des Panniculus und das solitäre, circumscribte
Lipom schon für das blosse Auge zwei so grundverschiedene Dinge, dass
kaum das Zwischenglied des Lipoma diffusum einen Uebergang be-
herzustellen imstande ist. Denn, wie überall, so macht auch hier die
Natur Uebergänge aller Art, aber die Endglieder der grossen Reihe sind
doch voneinander grundverschieden und zwar sowohl hinsichtlich ihrer
anatomischen wie ihres klinischen Verhaltens. Bezüglich des ersten
zeigen schon die einzelnen Fettzellen des Lipoms im allgemeinen ein
grösseres Volumen als die des Panniculus. Für das klinische Verhalten
aber ist ausserordentlich charakteristisch, dass bei auszehrenden Kran-
kheiten der stärkste Panniculus schwindet, während das Lipom da-
mit nicht nur nicht zurückgeht, sondern womöglich noch in seinem Wach-
thume fortfahren kann: ein Beweis dafür, dass der hypertrophische Pan-
niculus bei Obesitas stets viel mehr in physiologischem Zusammenhange
mit dem Organismus bleibt, während das Lipom eine pathologische Ent-
wicklung darstellt und demgemäss dem Zweckmässigkeitsgesetz der vita-
len Vorgänge nicht mehr unterworfen ist. Wenn schliesslich Grosch

Entstehungsursache speziell der solitären Lipome in einer Verminderung der Talg- und Schweissdrüsen-Sekretion der betreffenden Hautpartie (Trophoneurose der Haut) suchen, will, so begiebt er sich auf ein leichtfertiges zu machendes Gebiet. Zunächst müsste seine Theorie die Fortführung des Recidivs als notwendige Folge haben. In welcher Beziehung schliesslich das »tiefgelegene« subfasciale Lipom zum Drüsenapparat der Haut stehen soll, ist nicht abzusehen.

Es bliebe nur noch die von Cohnheim zur Erklärung der Aetiologie der Geschwülste aufgestellte Lehre von der embryonalen Anlage aller Geschwülste zu berücksichtigen übrig. Abgesehen aber davon, dass Cohnheim seine Theorie noch vor seinem Tode selbst wieder zurückgenommen haben scheint, giebt es wohl kaum eine Neubildung, auf welche die Cohnheim'sche Theorie so wenig anwendbar wäre, als das Lipom. Dieselbe wird hier, wie v. Volkmann sich ausdrückte, einfach zur Ursache; denn was soll der Ausdruck eines fötalen Keimes für das Fettgewebe bedeuten, wenn es sich nicht um die heterologen (heteropenen) Formen des Lipoms handelt!

Bemerkenswert ist, dass unsere Kasuistik 20 kongenitale tiefgelegene Lipome aufweist, was einen Prozentsatz von fast 20 repräsentiert! Ferner ist das weibliche Geschlecht nicht stärker als das männliche mit tiefen Lipomen behaftet. Unter den 68 Fällen, in denen mir eine Angabe des Geschlechts des Patienten vorliegt, befinden sich 34 Männer und 34 Weiber. (Gurlt in seiner Statistik der Lipome führt 127 Männer und 191 Weiber auf.)

Was die besonderen Eigentümlichkeiten und die Ausbreitungsweise der tiefgelegenen Lipome anlangt, so ist es entschieden auffällig, dass in keinem der von uns angeführten Fälle eine andere Form des Lipoms vorgelegen zu haben scheint, als die des circumscripten, abgekapselten. Wenn soweit mir nähere Angaben speziell über die Operation vorliegen, bestand dieselbe immer im wesentlichen in einer stumpfen Auslösung der Geschwulst, welche nur hier und da durch etwas mühsamere Präparation unterbrochen wird. Nirgends ist aber von diffuser Ausbreitung die Rede. Allerdings kann, worauf Volkmann in seinen Krankheiten der Bewegungsorgane (Pitha-Billroth S. 599) aufmerksam macht, die Exstirpation durch die vielen fingerförmigen Fortsätze, welche zwischen den Muskelrestitutionen etc. hinkriechen, schwierig werden; im allgemeinen lassen sich aber auch diese mit einiger Geduld stumpf hervorziehen und entfernen¹⁾.

1) Dagegen sind ganz diffuse und selbst multiple Anhäufungen im Panniculus adiposus, also suprafascial gar nicht selten, zumal bei Säugern. Das ist dann die richtige Ursache der lokalisierten Obesitas, wie das Doppelkinn, oder die ebenfalls häufiger vorkommenden, selbst über den Rockkragen hängenden ganz diffusen lipomatösen Wucherungen. R. von Volkmann hat eine grössere Zahl solcher Fälle auch in der Gegend des grossen Trochanters operirt und zwar ebensowohl bei ganz jungen Leuten (exclusiv Mädchen) als bei älteren Personen.

Während die subkutanen Lipome mehr oder minder die halbkugelige Form anzunehmen pflegen, ist diejenige der tiefen Lipome etwas ziemlich unregelmässige. Das erklärt sich durch die Straffheit der überdeckenden Fascien und durch den Widerstand der Muskeln, welche dem sich vergrössernde Lipom eventuell selbst wie einen Fremdkörper durch die entzündliche Bindegewebswucherung von sich abschliessen. So bildet sich denn die Form des tiefen Lipoms nach den umgebenden Partien, es folgt also vorzugsweise den Spalträumen zwischen den Muskeln, den Gefässen, Nerven, Sehnen und deren Scheiden. — Der straffe Widerstand der Fascien ist aber auch die Ursache, weshalb die tiefgelegenen Lipome nur ausnahmsweise sekundär unter der Cutis erscheinen (cfr. oben Cruveilhier), gewöhnlich schiebt sich nur ein relativ dünner Stiel durch irgend eine Lücke der Fascie hindurch und entwickelt sich hier als relativ kleinerer Lappen zum subkutanen Lipom. Dies sind die Fälle von subkutanen Lipomen, bei denen nach ihrer scheinbar vollständigen Exstirpation Recidive vorkommen!

Im allgemeinen verwachsen die tiefgelegenen Lipome nicht mit ihrer Umgebung, pflegen auch nicht eine erhebliche Atrophie der angrenzenden Organe hervorzurufen. Jedoch findet hiervon eine Ausnahme in den Fällen statt, wo die Raumbeschränkung durch die relative oder absolute Grösse besonders rasch wachsender Lipome zu erheblich wird. Für diese Fälle hat Schreger (cfr. oben) mit Recht hervorgehoben, dass Lipome, welche in Berührung mit Knochenhäuten und Gelenkkapseln stehen, sind mit diesen meistens auf das engste verwachsen. Unter dem Drucke der Geschwulst atrophirt der Knochen zu einer mehr oder weniger tiefen Grube, in welcher das Lipom eingebettet liegt. So fand ich niemals flache, rundliche Lipome in seichten Gruben des Stirnbeins. In der Tiefe dieser Gruben wird zuweilen durch einen Exostosenkranz, der sich am Rande erhebt, vermehrt. Selbst Perforationen flacher Knochen durch Lipome sind beobachtet worden.

In der Literatur findet sich hierfür kein Beispiel angegeben, Grosch hat in seiner mehrfach citirten Arbeit nachgewiesen, dass der vermeintliche Exostosenkranz meist nur eine entzündliche Verdickung des Periostes ist, welche nach der Exstirpation alsbald verschwindet. Dagegen finden wir aber einige Beispiele, dass Muskeln durch den Druck von Tumors stark atrophirt, und besonders zeigt der höchst interessante Fall von Dannien (No. 15), wie eine ganze Extremität im Wachsthum zurückbleiben kann.

Von regressiven Veränderungen ist zweimal (Fall 38 und 42) teilweise Verkalkung gefunden worden; einmal (Fall 61) ist ein zentrales „Konkrement“ erwähnt.

1) Cruveilhier: Traité etc.: se moulent sur les parties environnantes.

Wie schon oben bemerkt, ist die Diagnose eines tiefen Lipomes unter Umständen vor der Operation nicht möglich. Erschwert wird sie hauptsächlich durch zwei Umstände. Erstens pflegen die tiefgelegenen Lipome niemals eine so deutliche Lappung zu zeigen, wie die subkutanen Formen, da die einzelnen Lappen sind wenigstens so klein, dass sie bei ihrer tiefen Lage nicht palpirt werden können. Sodann aber fehlen die für die subkutanen Lipome so ausserordentlich charakteristischen Einziehungen der Haut bei seitlicher Kompression des Tumors.¹⁾ Natürlich, denn wie v. Volkmann in seinen klinischen Vorträgen stets hervorgehoben und auch Ranke²⁾ es beschrieben hat, rühren sie davon her, dass das Bindegewebsgerüst der Cutis, welches von der Cutis aus zwischen die einzelnen Lappen der Geschwulst eindringt, respektive dieselben bildet, nicht so nachgiebig ist wie das weiche, vordrück- und verschiebbare Fettzellengerüst und wie straff angespannte Zügel die Cutis zurückhält, während die buckligen und lappigen Lipommassen deutlich hervortreten. Nach v. Volkmann giebt es kein Symptom, welches mit grösserer Sicherheit ein subkutanes Lipom diagnostiziren lässt, als dieses. Dagegen kommen Verwechselungen der tiefen, unter der Fascie gelegenen Lipome, denen dieses Zeichen natürlich abgehen muss, häufig genug vor, und ist man derartige Lipome häufig genug für Abscesse, Hygrome, weiche maligne Geschwülste, ja ausnahmsweise sogar für Carcinome gehalten. Auch die älteren Chirurgen kommt noch dazu, dass sie, wie Cruveilhier in sich selbst erzählt, an das Vorkommen von Lipomen z. B. in den tieferen Schichten des Halses nicht glaubten. So konnte es eben geschehen, dass wegen eines als »Cancer« diagnostizirten tiefen Lipoms des Unterschenkels einer Frau die Oberschenkelamputation gemacht wurde (Fall 3).

Bei der Diagnose wird man also zunächst von der Thatsache ausgehen müssen, dass Lipome so zu sagen überall vorkommen und dann von allerlei anderen Tumoren höchst ähnliche objektive Symptome herbeiführen können. Subjektive Symptome sind aber nur selten vorhanden, und dass die Lipome von ihren Besitzern meistens erst bemerkt werden, wenn sie bereits eine gewisse Grösse erreicht haben. Dieser Zustand in Verbindung mit dem langsamen Wachstum der Geschwulst erklärt zum Theil ihr häufigeres Vorkommen im mittleren Lebensalter. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass ein langsam wachsendes oder auf seiner Entwicklungsstufe stehen gebliebenes Lipom später plötzlich ein schnelleres Wachstum zeigt, entweder zur Zeit der Pubertät oder in den 30er Jahren, auch der Panniculus adiposus stärker zu werden und die Fettzellen zu rühren pflegen. Heredität ist einige Male konstatiert; als kon-

1) v. Volkmann: Deutsche Naturforscher-Versammlung Berlin 1886.

2) Archiv für Klin. Chirurgie XX.

genitale Bildung stellt dagegen das tiefe Lipom einen hohen Prozentsatz. Die äussere Gestaltung eines tiefegelegenen Lipoms, soweit sie sich bei der einfachen Besichtigung geltend macht, ist nicht sehr charakteristisch. Sie bedingt eine mehr oder minder gleichmässige, oft wurstförmige Vorwölbung der Hautdecken, welche im übrigen normal zu sein pflegen und sich von dem Tumor in Falten abheben lassen. Die Palpation ergibt fast immer das Gefühl einer unsicheren, zuweilen aber auch täuschenden Fluktuation. Die Alten sagten, eine solche Geschwulst fühle sich wie ein prall mit Federn vollgestopfter Sack an¹⁾. Dennoch ist dies Gefühl der Pseudofluktuation, wie ich mich im Falle 60 überzeugen konnte, wesentlich von der echten Fluktuation verschieden. Krepitation ist bis jetzt nur an den Hand- und Fingerlipomen gefühlt worden; ich verweise deshalb auf die Arbeiten von Grosch und Ranke, wo auch die spezielle Differentialdiagnose von anderweitigen Handtumoren besprochen ist. — Eine Lappung ist gewöhnlich nur an den Rändern der Geschwulst nachzuweisen. Sie ist dann ebenso wie die fingerförmigen Fortsätze von grosser Bedeutung für die Diagnose. Letztere hindern ab und zu die im übrigen ziemlich freie Verschieblichkeit des Tumors auf seiner Unterlage. Im allgemeinen werden durch Lipome Nachbarorgane nicht verschoben, doch können Drucksymptome von Seiten der Nerven (oder auch Gefässe) vorkommen. (Fälle 16 und 17 etc.) Die Kombination eines subkutanen und eines tiefegelegenen, mittelst eines Stieles, hemdenknopf- oder zwerchsackartig zusammenhängenden Lipoms, von denen ersteres letzteres völlig verdecken kann, wird sich zuweilen aus dem Nachweis der Beweglichkeit behindern, den Fortsatz in die Tiefe diagnostizieren lassen. Der Troikart als diagnostisches Hilfsmittel ist dagegen im allgemeinen zu verwerfen und durch die Probeincision mit nachfolgender eventueller Exstirpation zu ersetzen.

Bezüglich der Therapie kommt selbstredend nur die unter strengster Asepsis ausgeführte Exstirpation in Betracht. Dieselbe wird nach breiter Blosslegung des Lipoms vornehmlich in einer stumpfen Ausschälung bestehen; festere, übrigens namentlich gerade in der Tiefe seltener vorhandene Verwachsungen werden mit der Schere durchtrennt. Dagegen ist bei grossen, oberflächlichen Lipomen die vielfach gedrückte und infiltrierte Haut oft sehr fest mit dem Lipom verwachsen, so dass man zunächst mit dem Messer arbeiten muss. Verletzungen grösserer Gefässe oder wichtiger Nerven können bei einiger Vorsicht nicht stattfinden; die Blutung ist meist sehr gering und rein venös; selbst bei grösseren Tumoren hat man gewöhnlich nur ein paar Ligaturen nötig. Sind dagegen bei subkutan gelegenen, sehr grossen und alten Lipomen die Venen selektisch, eventuell daumenstark, wie wir wiederholt gesehen haben,

1) Chelius, citirt in Bardeleben's Lehrbuch der Chirurgie Bd. II.

egt man nach R. v. Volkmann am besten zunächst und nur provisorisch einen Gummischlauch fest um die Basis der Geschwulst, um bis in diese ungestört mit dem Messer vordringen zu können. Man kommt dann meist über das Gebiet der Verwachsungen hinaus, und die weitere Ablösung der Geschwulst erfolgt, selbst wenn sie ein paar Köpfe gross ist, sehr leicht. Schwieriger wird die Operation, zumal bei tiefgelegenen Lipomen, nur nach vorhergegangenen septischen Prozessen, welche umfangreiche Verwachsungen veranlasst haben (Fall 2). Es ist deshalb schon eine frühzeitige Exstirpation tiefer Lipome durchaus angeraten. Ernste Störungen im Wundverlauf dürfen heutigen Tages nicht mehr vorkommen.

Bezüglich der Prognose kann man die günstigsten Garantien übernehmen. Von den Fällen unvollständiger Exstirpation mit Zurücklassung eines tiefgelegenen Lipomlappens abgesehen, recidivirt ein Lipom weder an loco, noch macht es jemals Metastasen oder Drüseninfektionen. Mischformen von Myxom und Lipom kommen allerdings vor, denen eine entschiedene Malignität nicht abgesprochen werden kann. Diese Malignität genügt aber, um diese Tumoren nicht den eigentlichen Lipomen zuzurechnen, sondern sie den Myxomen resp. Sarkomen zuzuweisen, und zwar sind von den Myxolipomen sowohl oberflächlich als tief sitzende Formen bekannt. Auch auf das Vorkommen von malignen Myxolipomen an den Nerven möchte ich wenigstens hinweisen.

Zum Schluss will ich darauf aufmerksam machen, dass, wie das Hand-, Finger- und Kopflipom, so auch das tiefe Lipom des Halses eine septische Erkrankungsform darzustellen scheint, deren genauere Besprechung ich mir für eine spätere Arbeit vorbehalte.

Lebenslauf.

Ich, Gustav Adolf Ludwig Plettner, Sohn des Königl. Gewerbe-
 ul-Direktors z. D. Dr. phil. Friedrich Plettner und dessen Ehefrau
 antonie, geb. Schmidt, wurde am 28. März 1861 zu Stralsund, Provinz
 mmern, geboren. Meine Vorbildung zum Universitäts-Studium erhielt
 auf dem Gymnasium meiner Vaterstadt und auf dem städtischen
 ymnasium zu Halle a. S., wohin mein Vater im Herbst 1876 versetzt
 urde. Zu Michaelis 1880 wurde mir das Zeugniß der Reife erteilt.

Meine medicinischen Studien begann ich auf der Universität zu
 ipzig, setzte sie in Freiburg i. B. fort und beendete sie in Halle a. S.
 auf letzterer Universität bestand ich am 5. Mai 1883 das Tentamen
 ysicum, am 13. März 1886 das Staats-Examen und am 28. Juli 1888
 s Examen rigorosum.

Zu besonderem Danke bin ich Herrn Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ols-
 usen und Herrn Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v. Volkmann verpflichtet.
 sterer hatte die Güte, mich im Wintersemester 1884 zu 85 als Volontär
 der Kgl. Frauenklinik zu Halle a. S. zu beschäftigen, letzterem ver-
 nke ich meine Stellung an der Kgl. chirurgischen Klinik, der ich seit
 m 15. December 1886 angehöre.

Als Universitäts-Lehrer verehere ich ferner die Herren:

Ackermann, Bernstein, Braune, Eberth, Graefe, Hankel,
 arnack, His, Kries, Leser, Oberst, Schwarz, Weber, Welcker,
 iedemann, Wiedersheim.

Meiner Militärpflicht genügte ich als Einjährig-Freiwilliger in Frei-
 rg i. B. (1. X. 83 bis 1. IV. 84) und als Einjährig-Freiwilliger-Arzt in
 alle a. S. (1. IV. 86 bis 1. X. 86).

Nachdem ich mich einer sechswöchentlichen Uebung als Unterarzt in
 gdeburg unterzogen hatte, wurde ich durch Allerhöchstes Patent vom
 März 1887 zum Assistenz-Arzt II. Kl. der Reserve ernannt.

Thesen.

- I. Die moderne Chirurgie ist eine Experimental-Wissenschaft.
 - II. Die Explorativpunktionen sind ausser in ganz besonderen Fällen zu vermeiden und wird durch dieselben im Allgemeinen vielmehr Schaden als Nutzen gestiftet.
 - III. Da die Tuberkulose der Extremitäten sowie diejenige der Hautdecken und der Schleimhäute, die überhaupt dem Chirurgen zugänglich sind, sich durch eine grosse Neigung zu Rückfällen auszeichnen, so müssen die Operationen Schlag auf Schlag erfolgen, wenn dauernde Heilungen erzielt werden sollen.
 - IV. Von allen bisher bekannten operativen Behandlungsarten des angeborenen, schweren Klumpfusses hat sich die sogenannte Phelps'sche Operation am besten bewährt.
-

